



“Lo dice la Fimmg”

# “CURE PRIMARIE”

SMARTLETTER DELLA FIMMG ROMA

Settimanale N°12

25 febbraio 2008

## **DIABETE TIPO II E NUOVI FARMACI :**

### **AIFA AUTORIZZA L'IMPIEGO DI EXENATIDE E SITAGLIPTIN-**

Con due determinazioni del 15 gennaio e pubblicate in GU numero 24 e 25 rispettivamente del 29 e 30 gennaio 2008 la Agenzia italiana del farmaco autorizza l'utilizzo delle due molecole nel trattamento del diabete di tipo II. L' EXENATIDE in associazione a metformina e/o una sulfonilurea in pazienti che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con la dose massima tollerata di queste terapie orali, il SITAGLIPTIN per migliorare il controllo glicemico in associazione con metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina non forniscono un controllo adeguato della glicemia. Il farmaco è prescrivibile, per l'ammissione alla rimborsabilità, esclusivamente da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, e sulla base di una scheda di arruolamento del paziente e di uno specifico e strutturato piano terapeutico, su modello A.I.F.A., di durata ben definita.

## **AIFA ED INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUI FARMACI:**

**NUOVE AVVERTENZE PER MOXIFLOXACINA E TIOCOLCHICOSIDE-** Una recente valutazione sulle reazioni avverse correlate alla somministrazione di Moxifloxacina (Avalox, Octegra, Actira, Profilox ) ha portato alle seguenti informazioni e raccomandazioni: Il trattamento con moxifloxacina è associato al rischio di sviluppare manifestazioni pericolose per la vita del paziente come epatite fulminante, che potenzialmente può portare ad insufficienza epatica, e reazioni cutanee bollose come la Sindrome di Stevens-Johnson (SJS) o la necrolisi epidermica tossica (NET). Per la scarsità dei dati clinici al riguardo, la somministrazione di moxifloxacina è controindicata nei pazienti con funzionalità epatica compromessa (categoria C secondo la classificazione di Child Pugh) e nei pazienti con valori delle transaminasi di oltre 5 volte il limite superiore della norma (LSN). I pazienti devono essere informati di sospendere il trattamento e di mettersi in contatto con il proprio medico qualora si manifestino segni e sintomi iniziali di queste reazioni. Le informazioni sul prodotto (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - RCP e Foglio Illustrativo - FI) sono state adeguatamente aggiornate.

**Per quanto riguarda il Tiocholchicoside ( Muscoril, Miotens, Tioside...), può far precipitare crisi epilettiche in pazienti con epilessia o in quelli a rischio di convulsioni .**

---

## **NOTE AIFA E PIANI TERAPEUTICI :**

**MODIFICATE NOTE 1 E 66 E NUOVI PIANI TERAPEUTICI PER NOTE 12-32 E 32 BIS-**

Sul sito [www.fimmgroma.org](http://www.fimmgroma.org) i testi dei provvedimenti

## **TV INSULTI AI MEDICI SU CANALE 5:**

*L'ORDINE DEI MEDICI DI ROMA QUERELA CECCHI PAONE -*

Dopo aver preso visione della registrazione della puntata del programma " Buona Domenica" del 27 gennaio l'Ordine dei Medici di Roma ha dato mandato ai propri legali di querelare per diffamazione Alessandro Cecchi Paone per le affermazioni rese e gli attacchi pesantissimi ed assolutamente falsi da questo rivolti ai Medici ed ai loro Ordini professionali. In un comunicato dai toni pacati l'Ordine dei Medici di Roma ha inoltre riportato che indagini promosse Centro Studi portano ad affermare che circa il 40% dei medici, operando in mancanza della indispensabile tranquillità, è costretto ad adottare una condotta professionale fatta anche di atti tesi a tutelare se stessi. Tutto ciò ha prodotto quella medicina difensiva che nulla ha a che vedere con la vera tutela dei cittadini italiani e che oltretutto determina un ingente sperpero di risorse economiche pubbliche oltre che private.

-----

## **PAPILLOMA VIRUS E INFERTILITA':**

*VACCINARE ANCHE I MASCHI ?-*

Questo è quanto emerso dal XIII Convegno di Medicina della Riproduzione, ad Abano Terme ( Pd ). La vaccinazione contro il Papilloma virus va estesa anche ai maschi, poiché il virus potrebbe annidarsi negli spermatozoi ha sottolineato l'esperto Carlo Foresta. Riferendosi alla campagna di vaccinazione che sta interessando le adolescenti di molte regioni d' Italia, il medico ha detto che 'e' incoerente non vaccinare anche i maschi. La scoperta che il Papilloma virus possa essere causa di infertilità e' stata fatta dai ricercatori dell' Università di Padova, i quali, esaminando cinquanta campioni di liquidi seminali di uomini infertili, hanno notato che il virus dell'Hpv e' presente nel 25 per cento dei casi, localizzato direttamente negli spermatozoi e nel loro Dna. L'Hpv sarebbe anche alla base del mancato successo della fecondazione assistita. ( ANSA 21-23 feb )

-----

## **SAN FILIPPO NERI - VARATO PROGETTO SPERIMENTALE:**

*" NATI OGGI , INSIEME PER LA VITA " NET CAM ON LINE-*

Così è chiamato il progetto divenuto realtà che persegue l'obiettivo di umanizzare l'evento della nascita, promuovendo la continuità del contatto madre-neonato in caso di ricovero del nascituro e la partecipazione consapevole dei genitori alla presa in cura del neonato. Nel rispetto rigoroso delle norme a tutela della privacy, è stato attivato un servizio di *Net Cam* che si avvale di un sistema protetto, mediante password e codici assegnati alle struttura ospedaliera, che permette ai genitori di neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva ed ai parenti da loro stessi individuati, di poter vedere via internet, sullo schermo del proprio computer, le immagini in tempo reale del neonato ricoverato, , in qualsiasi parte del mondo. Il ricovero del proprio figlio, subito dopo la nascita, in un reparto di Terapia Intensiva Neonatale è causa di ansie e gravi disagi psicosociali ai genitori e familiari e, grazie a questa moderna tecnologia si possono aiutare le famiglie a vivere con maggiore serenità questo evento angoscioso. ( Regione Lazio-Archivio news 19 feb ).

-----

## **ASL RMC - S.EUGENIO E LISTE DI ATTESA PER INTERVENTI CHIRURGICI :**

*NESSUNA CORRISPONDENZA PER I 4 ANNI DI ATTESA DENUNCIATI DAL SIGNOR P.G. -*

Questo è quanto emerso da un'indagine della Direzione Aziendale della ASL romana riguardo a quanto pubblicato sulle colonne di un quotidiano. Da un controllo effettuato sulle liste di attesa dell'Ospedale S. Eugenio relative alla patologia segnalata e dal sopralluogo del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, non risultano pazienti con le iniziali corrispondenti a

quelle del signore che avrebbe denunciato l'episodio. Ferma la volontà dell'Azienda di acquisire ogni utile informazione per fare chiarezza sul caso - del quale è stata interessata la Procura della Repubblica - si sottolinea ancora una volta la volontà dell'Azienda e dell'Assessorato alla Sanità di realizzare, nonostante i vincoli finanziari imposti dal Piano di Rientro, un'importante opera di ristrutturazione ed una razionale riorganizzazione dell'Ospedale S. Eugenio. ( Regione Lazio- Archivio news 21 feb )

---

## **AIFA ED INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUI FARMACI:**

### *CODEINA ED ALLATTAMENTO -NUOVE RACCOMANDAZIONI -*

La codeina è un alcaloide naturale dell'oppio che agisce sul sistema nervoso centrale. Essa è contenuta in specialità medicinali dispensabili soltanto su prescrizione medica ed è indicata, in associazione con altri principi attivi, per la sedazione della tosse e per il trattamento delle affezioni dolorose acute e croniche. Il profarmaco codeina viene trasformato nel metabolita attivo morfina tramite l'enzima citocromo P450 (CYP2D6). A causa di variazioni genetiche, circa il 5,5% della popolazione in Europa occidentale presenta un notevole aumento dell'attività dell'enzima CYP2D6. Questi soggetti sono definiti "metabolizzatori ultrarapidi" ed in essi è più probabile che si manifestino effetti indesiderati in seguito alla assunzione di codeina poiché convertono codeina in morfina più velocemente ed in maggiori quantità. Generalmente, se assunta a dosi terapeutiche, la codeina è escreta nel latte materno in quantità clinicamente trascurabili ma nel caso di madri metabolizzatrici ultra-rapide che allattano si può verificare un aumento delle concentrazioni di morfina nel sangue e nel latte, con conseguente aumento del rischio di reazioni avverse nel neonato. Contestualmente alla revisione del rapporto beneficio-rischio, attualmente in corso, l'AIFA ritiene necessario richiamare l'attenzione dei medici raccomandando loro quanto segue:

- 1) prescrivere medicinali a base di codeina nelle donne che allattano, soltanto previa attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio, alle più basse dosi efficaci e per brevi periodi di tempo ;
- 2) tenere sotto stretto controllo le pazienti in allattamento che sono in terapia con codeina ed i loro bambini;
- 3) informare le pazienti che allattano e che fanno uso di codeina sugli effetti collaterali tipici degli oppioidi, che potrebbero comparire nel bambino (sonnolenza, difficoltà nella suzione o nella respirazione, riduzione del tono muscolare e miosi) ed avvisarle di segnalare al medico l'eventuale comparsa nel bambino di tali sintomi. ( AIFA 15 FEB )

### **"Lo dice la Fimmg" (Newsletter-supplemento in versione telematica)**

Editore: Fimmg Roma

**Direttore:** Pierluigi Bartoletti

**Direttore responsabile:** Giampiero Pirro

Redazione: Piazza G. Marconi 25 Roma e.mail : [comunicazioneroma@fimmg.org](mailto:comunicazioneroma@fimmg.org)

**Capo Redattore:** Massimo Sabatini

Reg. Tribunale di Roma n.233/2004 del 27/5/2004

VUOI RICEVERE SULLA TUA E- MAIL QUESTA NEWSLETTER ?

Ovviamente se leggi questo avviso già sei registrato ma qualche collega che conosci potrebbe beneficiarne

Allora segnalaci chi vuole riceverci all'indirizzo [comunicazioneroma@fimmq.org](mailto:comunicazioneroma@fimmq.org)

Inoltre se hai iniziative, articoli o notizie inviaceli per la pubblicazione

(nb il servizio è riservato agli iscritti alla Fimmq di Roma)

### **FIMMG Roma NEWS**

È il nostro servizio di messaggistica SMS

Ti permette di essere informato in tempo reale di ciò che accade nel mondo sanitario e nella Fimmq. Per iscriverti manda un messaggio con i tuoi dati (nome cognome asl distretto) al telefono: 3404353637