



“Lo dice la Fimmg”

“CURE PRIMARIE”

SMARTLETTER DELLA FIMMG ROMA

Settimanale N° 13

03 marzo 2008

HPV-PAPILLOMA VIRUS :

AL VIA IN ITALIA LA CAMPAGNA VACCINALE -

Dal 23 febbraio si è avviata in tutta Italia la campagna vaccinale pubblica gratuita contro il Papilloma virus (HPV), l'agente virale responsabile del cancro della cervice uterina. Il vaccino sarà offerto quest'anno a tutte le 280.000 bambine nate nel 1997. L'Italia è il primo Paese europeo a pianificare una strategia di vaccinazioni pubblica gratuita contro l'HPV. L'obiettivo della campagna di vaccinazione è quello di giungere a una forte riduzione di questa malattia nelle prossime generazioni. In Italia la vaccinazione gratuita è rivolta alle bambine tra gli undici e i dodici anni di età, perché in questa fascia è massimo il profilo beneficio-rischio, anche se è allo studio un ulteriore sviluppo della strategia vaccinale che dovrebbe allargare in futuro l'età a 25-26 anni. I vaccini contro il virus Hpv attualmente disponibili sono due: Gardasil, vaccino tetravalente, che protegge contro i genotipi 16-18 dell'HPV, responsabili di circa il 70% dei casi di carcinoma uterino, e i genotipi 6 e 11, responsabili del 90% dei condilomi ed il Cervarix, vaccino bivalente, attivo contro i genotipi 16 e 18, responsabili di circa il 70% dei casi di carcinoma uterino. I vaccini sono somministrati gratuitamente dalle ASL alle bambine per via intramuscolare in tre dosi : una iniziale e due richiami, entro i sei mesi dalla prima. Il vaccino è comunque disponibile a pagamento in farmacia, (€ 171,74 per il Gardasil e € 156,79 per il Cervarix) previa indicazione e prescrizione del medico, ed è destinato alle donne che non hanno ancora contratto l'infezione da HPV. Prima di ricorrere alla vaccinazione è quindi importante fare un pap test per essere sicuri di non avere già contratto l'infezione. E' opportuno infine ricordare che il vaccino affianca ma non sostituisce lo screening periodico della cervice uterina, attualmente raccomandato per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, perché protegge dalle lesioni causate solo da alcuni genotipi di HPV oncogeni; per tutti gli altri genotipi oncogeni l'unica prevenzione resta il pap-test. (sett. Min Sal 23 feb)

RMD - FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE :

SUCCESSO DEL CORSO : " IL BAMBINO NEL SETTING DELLA C.A.-

Nelle due giornate del 6 e del 21 febbraio presso la sede della ASL RMD in Via di Casal Bernocchi con la completa adesione dei medici della C.A. della Asl , si è concluso il primo corso obbligatorio istituito dal **Centro di Formazione Regionale** nel quale sono stati trattati tutti gli aspetti medici ed organizzativi connessi con le patologie del bambino in una delle più frequenti cause di accesso al servizio. Aldo Vittorio Sotira, vice segretario provinciale Fimmg-CA , organizzatore del Corso insieme alla Scuola di Formazione in Medicina di Famiglia della Regione Lazio, ha dichiarato che

oltre che per la presenza, il gradimento dei partecipanti è stato manifestato per gli argomenti trattati ed ha annunciato la ripetizione , a breve, dei corsi obbligatori per i medici C.A. della RMC.

FARMACI E SEGNALAZIONE EVENTI AVVERSI:

RADDOPPIATE NEL 2007 LE SEGNALAZIONI-

L'anno scorso le segnalazioni sono cresciute quasi del 50% rispetto al 2006, per un totale di 9.788 denunce . Secondo una rilevazione riportata dal Sole 24 Ore, di queste denunce il 60 % sarebbe a vantaggio dei medici ospedalieri, mentre i MMG seguono con l' 11 %. Ultimi i farmacisti (6,9%), i pediatri (2,6%), gli infermieri (1,8%) e le imprese (0,18%). L'aumento delle segnalazioni è segno di maggiori controlli e la farmacovigilanza italiana sembra ora decisamente più attiva. (Sole 24 Ore 26 feb).

FORMAZIONE LAZIO E CONGRESSO ANNUALE:

MARZO 28-29-30 LA DATA DI SVOLGIMENTO DEL V APPUNTAMENTO ANNUALE-

La Scuola Regionale di Formazione di Medicina di Famiglia invita gli iscritti FIMMG che volessero partecipare inviando la propria richiesta di adesione alle numerose Aziende del farmaco sponsor della manifestazione, oppure alla segreteria regionale della Fimmg . Si comunica a tutti gli iscritti che nei prossimi giorni riceveranno un questionario riguardante le conoscenze sull'uso dei farmaci procinetici. Un particolare risalto sarà dato ad alcune patologie ed all'uso del Domperidone. Le risposte dovranno essere inviate per mail o per fax ed i risultati saranno commentati in una delle tre giornate del V Congresso regionale.

INFLUENZA E NUOVE LINEE GUIDA U.S.A.:

VACCINARE TUTTI FINO A 18 ANNI-

Da 6 mesi a 18 anni di età ; queste le indicazioni delle nuove linee guida sull'utilizzo delle sostanze immunizzanti contro la malattia stagionale che saranno per primo adottate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta (Cdc). Dal prossimo anno quindi negli Stati Uniti 30 milioni di bambini in piu' dovrebbero ricevere l'immunizzazione. In quella che appare la piu' grande espansione delle raccomandazioni sull'uso dei vaccini antinfluenzali - disponibili negli Usa dagli anni Quaranta - un comitato 'ad hoc' di esperti federali Usa ha approvato le nuove misure. Se le famiglie seguiranno i consigli, praticamente tutti i bambini minorenni, ad esclusione dei neonati di meno di 6 mesi e dei ragazzi allergici alle uova, verranno vaccinati. Sino ad oggi il vaccino era raccomandato per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni e per gli adulti oltre i 50. A convincere la commissione sarebbe stato un nuovo studio epidemiologico che ha dimostrato come somministrare il vaccino ai piccoli tra i 6 ed i 24 mesi di età diminuisce il rischio di ospedalizzazioni per complicazioni dell'influenza del 75%. A questo si aggiunge la considerazione che - secondo gli esperti - ogni anno bimbi e adolescenti vengono colpiti dal disturbo stagionale ad un tasso piu' alto di tutte le altre fasce della popolazione, trasmettendolo agli adulti piu' a rischio di complicazioni e costringendo i genitori a perdere giorni di lavoro per accudire i figli. Il comitato ha ricordato che il vaccino puo' essere somministrato non solo per iniezione ma con uno spray nasale. Ora la sfida sarà vedere non solo se la popolazione seguirà le nuove linee guida, ma se nella stagione 2009 ci saranno abbastanza dosi disponibili. (Washington-ANSA 29 feb)

SANITA' LAZIO:

TAR ORDINA INDAGINE SUL LANSOPRAZOLO-

Il Tar del Lazio ha chiesto all'Agenzia Italiana per il Farmaco "documentata relazione sul rilascio della registrazione di specialità medicinali a base di Lansoprazolo da parte di altri Stati europei sulla base di uno studio di bioequivalenza". La decisione del Tar è arrivata in relazione ad alcuni ricorsi proposti da aziende farmaceutiche produttrici di specialità a base di Lansoprazolo contro il provvedimento di diniego da parte dell'Aifa al rilascio dell'autorizzazione per l'immissione in commercio. Con un gruppo di ordinanze (tra le altre la n.271/08) il Tar, "considerato che ai fini dell'adozione della decisione definitiva sulla domanda cautelare è necessario acquisire da parte dell'Aifa ogni altro atto o documento utile", ha ordinato "di depositarli entro 30 giorni". La camera di consiglio per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare è stata fissata per il prossimo 28 maggio.

STATINE E CANCRO DEL RENE:

UNO STUDIO SU VETERANI MOSTRA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CA RENALE -

Era già noto da studi in vitro e su animali che le statine, comunemente usate nella riduzione dei valori del colesterolo, potessero sopprimere la crescita di cellule tumorali. La rivista Urology presenta uno studio retrospettivo caso-controllo condotto sui dati raccolti e valutati in modo prospettico in un database dei veterani negli anni 1998-2004. Analizzati i dati da 483,733 pazienti provenienti da otto stati del sud degli Stati Uniti, la principale variabile valutata è stata il riscontro di cellule di ca renale e l'uso delle statine prima della diagnosi di carcinoma renale. Sono anche stati considerati altri co-fattori come età, BMI, sesso ed abitudine al fumo. Il 34% dei veterani assumeva statine prima della diagnosi di ca renale; l'assunzione di statine è stata associata in modo significativo alla riduzione del rischio di ca renale del 48% (odds ratio 0.52, 95%, intervallo di confidenza da 0.45 a 0.60). Secondo le conclusioni dello studio le statine appaiono esplicitare un effetto protettivo contro lo sviluppo di cellule di ca renale dopo approssimazione per età, sesso abitudine al fumo ed obesità. Sono ora necessari studi randomizzati controllati per verificare questi dati e determinare se le statine possano avere un qualche ruolo nella prevenzione e nel trattamento del carcinoma renale (Urology 2008; 71: 118-122).

FDA ED ESOMEPRAZOLO:

APPROVATO L'USO NEI BAMBINI DA 1 AD 11 ANNI-

L'uso consentito a breve termine nel trattamento della GERD in due formulazioni: capsule a rilascio ritardato e liquido. Approvato l'uso del 10 e 20 mg una volta al giorno per 8 settimane, mentre per i ragazzi da 12 a 17 l'uso resta consigliato da 20 a 40 mg. L'FDA ha comunque sottolineato che questa nuova condizione d'uso va attentamente monitorizzata per l'eventuale comparsa di effetti avversi che per i bambini sono: cefalea, nausea, sonnolenza, secchezza delle mucose orali. (FDA 28 feb)

SANITA' LAZIO E SPESA FARMACEUTICA :

DIMINUITA NEL 2007 DEL 13 % -

Nel mese di gennaio 2008 la spesa farmaceutica è diminuita ancora del 2,25%. Un dato che conferma il trend in discesa registrato dalla Regione Lazio, dove da diciotto mesi la spesa

farmaceutica diminuisce costantemente. Nel 2007 l'abbattimento è stato del 13% corrispondente ad un risparmio di dieci milioni di euro, un risultato che ha definitivamente tolto al Lazio il primato negativo della maggior spesa farmaceutica. Motivi di questo risparmio sarebbero in relazione ai provvedimenti presi quali: indice di appropriatezza per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta, distribuzione diretta, distribuzione in nome e per conto, monitoraggio capillare della spesa, annullamento delle fustelle dei farmaci, coinvolgimento dei medici prescrittori nella scelta di farmaci generici e a brevetto scaduto(Regione Lazio news 28 feb)

"Lo dice la Fimmg" (Newsletter-supplemento in versione telematica)

Editore: Fimmg Roma

Direttore: Pierluigi Bartoletti

Direttore responsabile: Giampiero Pirro

Redazione: Piazza G. Marconi 25 Roma e.mail : comunicazioneroma@fimmg.org

Capo Redattore: Massimo Sabatini

Reg. Tribunale di Roma n.233/2004 del 27/5/2004

VUOI RICEVERE SULLA TUA E- MAIL QUESTA NEWSLETTER ?

Ovviamente se leggi questo avviso già sei registrato ma qualche collega che conosci potrebbe beneficiarne

Allora segnalaci chi vuole riceverci all'indirizzo comunicazioneroma@fimmg.org

Inoltre se hai iniziative, articoli o notizie inviaceli per la pubblicazione

(nb il servizio è riservato agli iscritti alla Fimmg di Roma)

FIMMG Roma NEWS

È il nostro servizio di messaggistica SMS

Ti permette di essere informato in tempo reale di ciò che accade nel mondo sanitario e nella Fimmg. Per iscriverti manda un messaggio con i tuoi dati (nome cognome asl distretto) al telefono: 3404353637